




化療副作用怎麼辦？



依嚴重程度分級，1為最輕微，5為最嚴重。
(參考資料：VCOG-CTCAE v2)

角落動物醫院製作

嗜中性球低下(Neutropenia)：

症狀通常不特異，主要是以精神下降、可能伴隨發燒。此時期比較容易出現繼發感染，請盡量避免外出、洗澡、與其他動物接觸。


分級	定義	處理方式
第一級	1500/ μ L- 小於正常值	給予口服抗生素，並給予對症藥物。 +/- 皮下點滴注射。 通常不需住院。
第二級	1000-1499/ μ L	
第三級	500-999/ μ L	給予注射型抗生素，給予對症藥物，並且配合皮下點滴注射。依醫師評估，可能需要住院。
第四級	<500/ μ L	
第五級	致死	--

食慾改變(Altered appetite)：

化學治療通常對於腸道細胞會有毒性，可能造成寶貝食量變小或是變得挑食。可以藉由藥物或是多元食物改善，但是務必不要給人吃的食物喔！

分級	定義	處理方式
第一級	食慾下降 \leq 一週	自行恢復+/- 給予食慾促進劑或腸道對症藥物。
第二級	食慾下降1-2週	給予食慾促進劑或腸道對症藥物+/- 暫時停止治療或是拉長治療間隔。
第三級	食慾下降>2週	給予食慾促進劑或腸道對症藥物。暫時停止治療、拉長治療間隔或是可能需要換其他種化療藥物。
第四級	--	--
第五級	--	--

若超過24小時完全不吃飯
務必要聯絡醫師回診！



化療副作用怎麼辦？



依嚴重程度分級，1為最輕微，5為最嚴重。
(參考資料：VCOG-CTCAE v2)

角落動物醫院製作

嘔吐(Vomiting)：

化學藥物可能導致噁心、嘔吐的症狀，若出現流口水，嘔吐時，可以依循下列建議。嘔吐發生時間可能不定，但通常會伴隨腹部用力收縮，也建議飼主可以記錄飲食、發生時機及動作，亦可以錄影紀錄，提供醫師判斷的依據喔！

分級	症狀	處理方式
第一級	嘔吐發生≤24小時。不一定需要藥物或是點滴治療即可自行緩解者。	若沒有影響寶貝精神食慾，可以先觀察，但若嘔吐很頻繁且影響精神食慾可以給予止吐藥物。
第二級	嘔吐發生超過24小時。	給予只吐藥物+/-其他腸道對症藥物。可以給予少量稀釋過的運動飲料或是皮下點滴，避免脫水。對藥物有反應者可持續居家觀察。
第三級	嚴重嘔吐（對於口服藥物無反應者或是餵藥就吐無法吸收藥物者）	務必馬上聯絡醫師，需住院給予藥物及靜脈點滴。
第四級	嚴重嘔吐：導致嚴重脫水，出現低血壓甚至昏厥者。	可能致命，務必馬上送至急診醫院。
第五級	致死	--

下痢(Diarrhea)：

糞便成有形都可以接受，若出現不成形糞便(泥狀、水狀)為異常，須記錄發生頻率、糞便顏色以及飲食，協助醫師判斷嚴重程度、是否與化療有關。另外也常出現頻繁蹲便但卻沒有糞便出來的動作，稱為“裏急後重”，若出現此症狀，可以聯繫醫師開立藥物讓腸道症狀緩解，讓寶貝能更舒適！

分級	症狀	處理方式
第一級	糞便不成形或是泥狀，但是持續時間≤24小時。不需依靠藥物就能自行緩解。	若沒有影響寶貝精神食慾，可以先觀察，但若排便很頻繁且影響精神食慾可以給予止瀉藥物。
第二級	下痢時間超過24小時。	給予止瀉藥物+/-其他腸道對症藥物。若糞便為水痢且寶貝食慾顯著下降，可以給少量稀釋過的運動飲料或是給予皮下點滴，避免寶貝脫水。對藥物有反應者可持續居家觀察。
第三級	嚴重下痢（水痢、出血、裏急後重）等，在家給予藥物後無改善者。	務必馬上聯絡醫師，需住院給予藥物及靜脈點滴。
第四級	嚴重下痢：導致嚴重脫水、導致低血壓甚至昏厥。	可能致命，務必馬上送至急診醫院。
第五級	致死	--