

角落動物醫院 癲癇寵物返家照顧重點

寵物也會癲癇?沒錯，寵物和人一樣，都會有癲癇的問題。癲癇本身是個症狀的描述，舉凡肝臟、腎臟疾病、感染、頭部創傷或是腦部本身問題..等，都有可能造成癲癇。當癲癇病患由緊急病程轉為穩定後，家中罹患有癲癇寵物的爸媽，要如何照顧他們呢?別緊張，我們列出了幾項重要的注意事項，只要充分做好下述動作，就能掌握寵物們的狀況了!

1. 請依照醫囑準時並且持續不斷的讓寵物服用口服藥物。如果給予過量藥物寵物可能產生昏迷，突然中斷給予藥物可能使癲癇再發生。
2. 癲癇藥物只能對症緩解症狀，並不能化解真正造成癲癇之原因。如是腦部病變病患通常必須長期口服藥物控制癲癇。
3. 給予藥物後常見的副作用包括多渴、多尿、食慾增加。其他藥物過量的副作用有嘔吐、四肢僵硬、無力等。抗癲癇藥物通常對於肝臟功能有副作用，必須每兩星期回診抽血監測血液數值(血球計數/血液生化及離子數值)以評估肝功能。肝功能若出現問題常見的症狀包括厭食、鎮靜、黃疸、腹水等。
4. 嚴重的癲癇病患通常需要一生持續服藥，醫療目的在於把癲癇發生頻率控制在 4-6 週只發生一次或更少。
5. 居家照顧時若寵物癲癇發作，請畜主紀錄寵物癲癇發作時間、頻率、長度及強度。必要時將其錄影起來。

6. 如果寵物癲癇發作了怎麼辦？

- A. 請主人保持冷靜
- B. 不要把手放到寵物的嘴巴或附近，這樣做不會幫助寵物並且可能會被咬。
- C. 把寵物周圍尖銳物品移開或收起避免撞到受傷。
- D. 如果寵物在沙發或是人的床上，將寵物平穩的抱起放在地上，避免摔傷。
- E. 家中有小孩或其他動物避免讓他們接觸正在發作中的寵物。
- F. 觀察並紀錄發生的細節(發作時間點、頻率、長度及強度)，拿起身邊可錄影的器材開始錄影。

****如果癲癇症狀發生持續超過 3 分鐘，或是發生後馬上又發生下一個癲癇，此狀況需要緊急醫療處理，請立即聯絡您的獸醫師。

通常輕微、單一發生的癲癇並不是緊急狀況，但必須記錄監控；在下次回診時提供給您的獸醫師。



Corner Animal Hospital

角落動物醫院 ~關心您與您毛小孩的健康~